



Lipthal[®]

Comprimido revestido 10mg

Comprimido revestido 20mg

MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE



Lipthal[®]

atorvastatina cálcica

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido 10mg

Embalagens contendo 10, 20, 30, 60, 100, 200 e 500 comprimidos.

Comprimido revestido 20mg

Embalagens contendo 10, 20, 30, 60, 100, 200 e 500 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de 10mg contém:

atorvastatina cálcica (equivalente a 10mg de atorvastatina).....10,85mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: carbonato de cálcio, celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, polissorbato 80, hiprolose, estearato de magnésio, emulsão de simeticona, Opadry[®] branco (hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e talco) e água de osmose reversa.

Cada comprimido revestido de 20mg contém:

atorvastatina cálcica (equivalente a 20mg de atorvastatina).....21,69mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: carbonato de cálcio, celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, polissorbato 80, hiprolose, estearato de magnésio, emulsão de simeticona, Opadry[®] branco (hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e talco) e água de osmose reversa.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Lipthal[®] (atorvastatina cálcica) comprimidos revestidos é indicado para tratamento de:

- hipercolesterolemia (aumento da quantidade de colesterol no sangue) isolada;
- hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia (aumento dos níveis sanguíneos de outro tipo de gordura);
- hipercolesterolemia associada à redução dos níveis sanguíneos de HDL (tipo de colesterol);

-hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia e associado também a redução dos níveis sanguíneos de HDL.

Inclusive hipercolesterolemias de transmissão genética/familiar (familiar homozigótica, disbetalipoproteinemia, etc), quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas.

Lipthal[®] é indicado para prevenção secundária (aquela que é instituída depois de um evento para evitar que ele ocorra novamente) de síndrome coronária aguda (doença em que o músculo cardíaco recebe menor fluxo de sangue). Lipthal[®] também pode ser usado para prevenção de complicações cardiovasculares (vasos sanguíneos e coração) em pacientes sem doença cardiovascular ou dislipidemia preexistente, mas com múltiplos fatores de risco (tabagismo, hipertensão, diabetes, HDL baixo ou história familiar de doença cardíaca precoce). Lipthal[®] é indicado para o tratamento de pacientes com doença cardíaca (do coração) e coronariana (dos vasos do coração) para reduzir o risco de complicações como: infarto do miocárdio não fatal, de acidente vascular cerebral (derrame) fatal e não fatal, de procedimentos de revascularização (para desobstrução das artérias), de hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue para o corpo) e de angina (dor no peito devido a problemas no coração e seus vasos).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Lipthal[®] age reduzindo a quantidade de colesterol (gordura) total no sangue diminuindo os níveis das frações prejudiciais (LDL-C, apolipoproteína B, VLDL-C, triglicérides) e aumentando os níveis sanguíneos do colesterol benéfico (HDL-C). A ação de Lipthal[®] se dá pela inibição de produção de colesterol pelo fígado, e aumento da absorção e destruição de frações prejudiciais (LDL) do colesterol.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lipthal[®] é contraindicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula; doença hepática (do fígado) ativa ou elevações persistentes inesperadas das transaminases séricas (enzimas do fígado), excedendo em 3 vezes o limite superior da normalidade; durante a gravidez ou lactação (amamentação) ou a mulheres em idade fértil que não estejam utilizando medidas contraceptivas (para evitar gravidez) eficazes. Lipthal[®] deve ser administrado a adolescentes e mulheres em idade fértil somente quando a gravidez for altamente improvável e desde que estas pacientes tenham sido informadas dos potenciais riscos ao feto.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre avise o seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. Siga estritamente as orientações do seu médico. Medicamentos que reduzem a quantidade de lípidos (gordura) no sangue agem no metabolismo (transformação) dos lípidos no fígado, raramente isso pode levar a alteração dos níveis de enzimas hepáticas (substâncias produzidas pelo fígado) na corrente sanguínea, que voltam ao normal com diminuição ou retirada do tratamento. Recomenda-se que testes de função do fígado sejam feitas antes do início do tratamento e periodicamente. Lipthal[®] deve ser usado com cuidado em pacientes com maior risco de alterações da função do fígado (por exemplo, uso

abusivo de bebidas alcoólicas, portadores de doenças hepáticas). Pacientes com AVC hemorrágico (tipo de derrame cerebral) prévio parecem apresentar um risco maior para apresentarem um novo AVC hemorrágico. Relate imediatamente ao seu médico se surgirem inesperadamente dor muscular, alterações da sensibilidade ou fraqueza muscular, particularmente se for acompanhada de mal-estar ou febre. Miopatia (dor ou fraqueza muscular) devido à lesão dos músculos (diagnosticada através do aumento dos valores da substância CPK no sangue) e miopatia necrosante autoimune (doença muscular) podem ocorrer em pacientes que usam atorvastatina cálcica, sendo mais frequentes naqueles que usam medicamentos que aumentam a concentração sistêmica de atorvastatina (como por exemplo, eritromicina, claritromicina, diltiazem, itraconazol, etc.).

Avise imediatamente o seu médico caso você faça uso de alguma dessas medicações. Há raros casos de rabdomiólise (destruição de células musculares) acompanhada de alteração da função dos rins (insuficiência renal aguda) relatados em usuários de medicações da classe da atorvastatina cálcica. Por isso em situações em que os riscos de rabdomiólise aumentarem (infecção aguda grave, hipotensão – pressão baixa, cirurgia de grande porte, politraumatismos, distúrbios metabólicos, endócrinos, eletrolíticos e convulsões não controladas) recomenda-se a interrupção temporária de Lipthal[®]. Lipthal[®] é contraindicado durante a gravidez (vide item 3. Quando não devo usar este medicamento?). Não se sabe se Lipthal[®] é excretado no leite materno, devido aos riscos potenciais para os lactentes (bebês que mamam leite materno), mulheres utilizando Lipthal[®] não devem amamentar. A administração concomitante de atorvastatina cálcica com medicamentos inibidores do CYP 3A4 ou indutores do CYP 3A4 (sistemas de quebra de vários medicamentos) (por ex., ciclosporina, eritromicina/claritromicina, inibidores da protease, letermovir, cloridrato de diltiazem, cimetidina, itraconazol, suco de grapefruit, efavirenz, rifampicina) pode alterar a quantidade de atorvastatina no sangue. Os inibidores de transportadores glicoproteína e pibrentasvir e o elbasvir e grazoprevir aumentam a exposição à atorvastatina. São conhecidas outras interações medicamentosas, avise seu médico se você fizer uso de: antiácidos, colestipol, digoxina, azitromicina, contraceptivos orais (pílulas), varfarina, ácido fusídico.

Efeitos na Habilidade de Dirigir ou Operar Máquinas: Não há evidências de que atorvastatina cálcica possa afetar a habilidade do paciente de dirigir ou operar máquinas.

Uso em Crianças: atorvastatina cálcica 10mg e 20mg está indicada para o tratamento de hipercolesterolemia em pacientes acima de 10 anos de idade. As adolescentes devem ser aconselhadas sobre os métodos contraceptivos (para evitar gravidez) apropriados enquanto estiverem em tratamento com atorvastatina cálcica.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

A atorvastatina cálcica não deve ser utilizada por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento: Comprimido em forma de elipse, núcleo de cor branca e revestimento de cor branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser usado após a prescrição médica. A dose pode variar de 10 a 80mg em dose única diária, usada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos. As doses iniciais e de manutenção devem ser individualizadas de acordo com os níveis iniciais do colesterol sanguíneo, a meta do tratamento e a resposta do paciente. Após o início do tratamento e/ou durante o ajuste de dose de Lipthal[®], os efeitos aparecem após 2 a 4 semanas, portanto os exames para avaliação do resultado do ajuste da dosagem devem ser feitos após esse período.

Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática (prejuízo da função do fígado): (vide item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?).

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal (diminuição da função dos rins): a insuficiência renal não apresenta influência nas concentrações plasmáticas (sanguíneas) da atorvastatina cálcica. Portanto, o ajuste de dose não é necessário.

Uso em Idosos: não foram observadas diferenças entre pacientes idosos e a população em geral com relação à segurança, eficácia ou alcance do objetivo do tratamento de lípidos (gorduras do sangue).

Uso combinado com outros medicamentos: quando a coadministração de atorvastatina cálcica e ciclosporina, telaprevir, tipranavir/ritonavir ou glecaprevir/pibrentasvir é necessária, a dose de Lipthal[®] não deve exceder 10mg.

O uso de atorvastatina cálcica não é recomendado em pacientes que tomam letermovir coadministrado com ciclosporina.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você se esqueça de tomar uma dose de Lipthal[®] no horário estabelecido pelo seu médico, tome-a assim que lembrar. Não tome Lipthal[®] se fizer mais de 12 horas que você se esqueceu de tomar a sua última dose. Espere e tome a dose seguinte no horário habitual. Não tome 2 doses de Lipthal[®] ao mesmo tempo. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A atorvastatina cálcica é geralmente bem tolerada. As reações adversas foram geralmente de natureza leve e transitória. Os efeitos adversos mais frequentes (reação comum - ocorre em 1% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento) que podem ser associados ao tratamento com atorvastatina cálcica são: nasofaringite (resfriado comum), hiperglicemia (aumento de glicose do sangue), dor faringolaríngea (de garganta), epistaxe (sangramento nasal), diarreia, dispepsia (má digestão), náusea (enjoo), flatulência (excesso de gases no estômago ou intestinos),

artralgia (dor nas articulações), dor nas extremidades, dor musculoesquelética (músculos e ossos), espasmos musculares (contrações involuntárias), mialgia (dor muscular), edema articular (inchaço da articulação), alterações nas funções hepáticas (do fígado), aumento da creatina fosfoquinase sanguínea (CPK – enzima que aumenta quando há lesão muscular).

Efeitos adicionais relatados nos estudos placebo-controlados: Pesadelo, visão turva, tinido (zumbido no ouvido), desconforto abdominal, eructação (liberação de gases pela boca), hepatite (inflamação do fígado) e colestase (parada ou dificuldade da eliminação da bile), urticária (alergia da pele), fadiga muscular (cansaço do músculo), cervicalgia (dor na região cervical), mal-estar, febre, presença de células brancas positivas na urina. Em pacientes pediátrico (idade entre 10 e 17 anos): Infecções.

Efeitos adicionais na experiência pós-comercialização: Trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), reações alérgicas (incluindo anafilaxia - reação alérgica grave), ruptura do tendão, aumento de peso, hipoestesia (perda ou diminuição da sensibilidade), amnésia, tontura, disgeusia (paladar alterado), pancreatite (inflamação no pâncreas), síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (doença cutânea em que a camada superficial da pele se solta em laminas), angioedema (inchaço), eritema multiforme (reação imunológica das mucosas e da pele), rash bolhosa (erupções em forma de bolha na pele), rabdomiólise (danos na musculatura esquelética com liberação de componentes celulares na circulação), miopatia necrosante autoimune (doença muscular), miosite (inflamação dos músculos), dor nas costas, dor no peito, edema periférico (inchaço nas extremidades), fadiga (cansaço).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Não há tratamento específico para superdosagem com Liplthal[®]. No caso de superdosagem, o paciente deve receber tratamento sintomático e devem ser instituídas medidas de suporte, conforme a necessidade.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº 1.0370.0559

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
09/06/2013	0455689/13-5	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	09/06/2013	0455689/13-5	10457 - SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC – 60/12	09/06/2013	Versão inicial	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
26/06/2014	0504036/14-1	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	26/06/2014	0504036/14-1	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	26/06/2014	4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
06/10/2014	0882651/14-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/10/2014	0882651/14-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/10/2014	8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
30/11/2015	1037217/15-1	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para	30/11/2015	1037217/15-1	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para	30/11/2015	Identificação do Medicamento	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x

		adequação à intercambialidade			adequação à intercambialidade				30. -20mg com rev ct bl x 60.
30/11/2015	1037222/15-9	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	30/11/2015	1037222/15-9	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	30/11/2015	1. Para que este medicamento é indicado? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
25/05/2016	1808780/16-9	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/05/2016	1808780/16-9	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/05/2016	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
16/10/2018	1002285/18-6	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/10/2018	1002285/18-6	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/10/2018	Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Local de Fabricação	VP	-10mg com rev ct bl x 30. -10mg com rev ct bl x 60. -20mg com rev ct bl x 30. -20mg com rev ct bl x 60.
16/04/2019	0343149/19-5	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/04/2019	0343149/19-5	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/04/2019	Apresentações Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60.

									<ul style="list-style-type: none">-10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac).-10mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp).-10mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).-20mg com rev ct bl al/al x 10.-20mg com rev ct bl al/al x 20.-20mg com rev ct bl al/al x 30.-20mg com rev ct bl al/al x 60.-20mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac).-20mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp).-20mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).-40mg com rev ct bl al/al x 10.-40mg com rev ct bl al/al x 20.-40mg com rev ct bl al/al x 30.-40mg com rev ct bl al/al x 60.-40mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac).-40mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp).-40mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).-80mg com rev ct bl al/al x 10.-80mg com rev ct bl al/al x 20.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									-80mg com rev ct bl al/al x 30. -80mg com rev ct bl al/al x 60. -80mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -80mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).
10/06/2019	0512703/19-3	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/06/2019	0512703/19-3	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/06/2019	NA	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60. -10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -10mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -10mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 10. -20mg com rev ct bl al/al x 20. -20mg com rev ct bl al/al x 30. -20mg com rev ct bl al/al x 60. -20mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -20mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).

									-40mg com rev ct bl al/al x 10. -40mg com rev ct bl al/al x 20. -40mg com rev ct bl al/al x 30. -40mg com rev ct bl al/al x 60. -40mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -40mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -40mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 10. -80mg com rev ct bl al/al x 20. -80mg com rev ct bl al/al x 30. -80mg com rev ct bl al/al x 60. -80mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -80mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).
05/03/2020	0667760/20-6	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	05/03/2020	0667760/20-6	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	05/03/2020	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento?	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60. -10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac).

									-80mg com rev ct bl al/al x 60. -80mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -80mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).
31/03/2020	0967412/20-8	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/03/2020	0967412/20-8	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	31/03/2020	N/A	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60. -10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -10mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -10mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 10. -20mg com rev ct bl al/al x 20. -20mg com rev ct bl al/al x 30. -20mg com rev ct bl al/al x 60. -20mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -20mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -40mg com rev ct bl al/al x 10.

									-40mg com rev ct bl al/al x 20. -40mg com rev ct bl al/al x 30. -40mg com rev ct bl al/al x 60. -40mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -40mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -40mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 10. -80mg com rev ct bl al/al x 20. -80mg com rev ct bl al/al x 30. -80mg com rev ct bl al/al x 60. -80mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -80mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).
22/02/2021	0707915/21-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/02/2021	0707915/21-0	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22/02/2021	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento?	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60. -10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -10mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp).

									<p>-10mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 10. -20mg com rev ct bl al/al x 20. -20mg com rev ct bl al/al x 30. -20mg com rev ct bl al/al x 60. -20mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -20mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -40mg com rev ct bl al/al x 10. -40mg com rev ct bl al/al x 20. -40mg com rev ct bl al/al x 30. -40mg com rev ct bl al/al x 60. -40mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -40mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -40mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 10. -80mg com rev ct bl al/al x 20. -80mg com rev ct bl al/al x 30. -80mg com rev ct bl al/al x 60.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									-80mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -80mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -80mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).
08/06/2023	-	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/06/2023	-	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/06/2023	Apresentações Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Dizeres legais	VP	-10mg com rev ct bl al/al x 10. -10mg com rev ct bl al/al x 20. -10mg com rev ct bl al/al x 30. -10mg com rev ct bl al/al x 60. -10mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -10mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -10mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 10. -20mg com rev ct bl al/al x 20. -20mg com rev ct bl al/al x 30. -20mg com rev ct bl al/al x 60. -20mg com rev ct bl al/al x 100 (emb frac). -20mg com rev ct bl al/al x 200 (emb hosp). -20mg com rev ct bl al/al x 500 (emb hosp).